

レジメン名	薬剤名	投与量/投与方法	投与日	投与間隔(日)	
膵臓がん・胆道がん					
膵臓癌: GEM	ゲムシタビン	1,000mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	day1・8・15	28日
膵臓癌: GEM+S-1	ゲムシタビン	1,000mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	day1・8	21日
	S-1	1日2回 40-60mg/回	経口	day1-14	
膵臓癌: GEM+nab-PTX	ゲムシタビン	1,000mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	day1・8・15	28日
	ナブ <sup>®</sup> パクリタキセル	125mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	day1・8・15	
膵臓癌: FOLFIRINOX	オキサリプラチン	85mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	day1	14日
	イリリテカン	180mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 (同時投与)		
	レボ <sup>®</sup> ホリナートカルシウム	200mg/m <sup>2</sup>			
	フルオロウラシル	400mg/m <sup>2</sup>	急速静注		
	フルオロウラシル	2400mg/m <sup>2</sup>	持続静注		
胆道癌: CDDP+GEM	シスプラチン	25mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	day1・8	21日
	ゲムシタビン	1,000mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	day1・8	
胆道癌: GEM	ゲムシタビン	1,000mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	day1・8・15	28日